

## ESAMI NECESSARI PER LA PRIMA VISITA

PER SUA COMODITÀ, TUTTI QUESTI ACCERTAMENTI POTRANNO ESSERE REALIZZATI PRESSO LA CLINICA EUGIN

- DURANTE LA SUA PRIMA VISITA -

AD UN PREZZO RIDOTTO RISPETTO AL SUO PAESE

**Non vi è alcun inconveniente se il giorno della prima visita coincide con la mestruazione\***

**TUTTAVIA, SE PER QUALCHE MOTIVO DESIDERA PORTARLI GIÀ FATTI, LE INDICHIAMO LA LISTA DEGLI ESAMI E LA LORO VALIDITÀ**

### DONNA

### VALIDITÀ

#### Analisi del sangue

- Emocromo completo (1 anno)
- Esami di coagulazione (PT, aPTT) (6 mesi)
- Gruppo sanguigno ed Rh (effettuare solo una volta)
- Coombs indiretto (solo in caso di gruppo sanguigno e fattore Rh sconosciuto o in caso di fattore Rh negativo). (effettuare solo una volta)
- Dosaggio ormonale basale, realizzato tra il 2° e il 4° giorno del ciclo (FSH, LH, estradiolo)  
O, in alternativa, il test AMH (ormone antimülleriano) realizzabile in qualunque giorno del ciclo. (1 anno)  
*(Prima di una inseminazione o una FIV con i propri ovuli qualora il medico lo reputi necessario)*
- Esami epatici (SGOT, SGPT, bilirubina totale) (1 anno)
- Sierologie (VDRL o RPR e TPHA o FTA-ABS, epatite C, antigene epatite B, HIV, rosolia IgG). (in assenza di infezione cronica, 1 anno)

#### Esami ginecologici

- Ecografia transvaginale (1 anno, in assenza di patologie)  
*(se non dispone di questo esame, glielo realizzeremo gratuitamente alla clinica EUGIN)*
- \* Esame citologico cervico-vaginale (Pap test). (se negativa: 2 anni)  
*Non può essere realizzato durante il ciclo mestruale.*
- \* Tampone endocervicale per Gonococco e Chlamydia, solo in caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita. (1 anno)  
*Non può essere realizzato durante il ciclo mestruale.*

#### **Nel caso in cui sia indicata un'inseminazione intrauterina**

Si richiede un'isterosalpingografia (tranne in caso di una gravidanza recente).

#### **Nel caso in cui sia indicata una FIV (Fecondazione In Vitro) o una ricezione di ovociti**

È molto importante disporre di un esame della cavità uterina (isteroscopia o isterosalpingografia, ma si accetterà anche un'isterosonografia) fin dalla prima visita ed è praticamente indispensabile in caso di precedenti cicli falliti di FIV. A seconda dell'anamnesi, l'isteroscopia potrà essere consigliata il giorno della prima visita.

## ESAMI NECESSARI PER LA PRIMA VISITA

**PER SUA COMODITÀ, TUTTI QUESTI ACCERTAMENTI POTRANNO ESSERE REALIZZATI PRESSO LA CLINICA EUGIN**

**- DURANTE LA SUA PRIMA VISITA -**

**AD UN PREZZO RIDOTTO RISPETTO AL SUO PAESE**

**Non vi è alcun inconveniente se il giorno della prima visita coincide con la mestruazione\***

**TUTTAVIA, SE PER QUALCHE MOTIVO DESIDERA PORTARLI GIÀ FATTI, LE INDICHIAMO LA LISTA DEGLI ESAMI E LA LORO VALIDITÀ**

### DONNA

### VALIDITÀ

**Altri** (presentarli solo se sono già stati effettuati):

- Cariotipo (effettuare solo una volta)
- Studio della coagulazione completo (anticorpi anticardiolipini, anticoagulante circolante ecc.) (i parametri valutati sono diversi dallo standard). (in caso di aborti ripetuti)
- In caso di patologie gravi o di uno stato di salute che possano contraindicare un trattamento di Riproduzione Assistita (es. cardiopatie, ipertensione, diabete, cancro, anomalie genetiche, malattie croniche o altro), si prega di contattare previamente la clinica e fornire un ampio resoconto medico del suo specialista.
- In caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita, sarà imprescindibile presentare un referto dell'infettivologo, come indicato nel modello allegato.
- In caso di vaccinazione contro l'epatite B, se possiede analisi con HB Ac (anticorpo) e le presenta il giorno della prima visita non dovrà ripeterle.

**Risultati di cicli di fecondazione assistita precedenti** (inseminazioni, FIV, FIV-ICSI - fecondazioni in vitro con microiniezione spermatica ecc.), nel caso in cui ne possieda i referti.

### Situazione particolare: se ha già compiuto 45 anni il giorno del transfer

(applicabile solo alle pazienti riceventi di ovociti)

È necessario agire con estrema prudenza ed esaminare ogni caso separatamente. Uno studio più esaustivo sarà quindi necessario, al fine di conoscere, per quanto possibile, i rischi potenziali della gravidanza, sia per la paziente che per il/i suo/suoi figlio/i. I rischi di morbilità e mortalità nella donna incinta aumentano in modo estremamente significativo con l'età (specialmente per quanto concerne l'ipertensione arteriosa e la preeclampsia), soprattutto a partire dai 45 anni.

In questi casi è imprescindibile effettuare i seguenti esami complementari:

Mammografia	(1 anno)
Ecografia mammaria	(1 anno)
Elettrocardiogramma con referto	(1 anno)
Glicemia a digiuno (analisi del sangue)	(1 anno)
Referto del Suo medico di famiglia, cardiologo o ginecologo/ostetrico che autorizzi una gravidanza in base ai risultati ottenuti e la cartella clinica.	(1 anno)

## ESAMI NECESSARI PER LA PRIMA VISITA

PER SUA COMODITÀ, TUTTI QUESTI ACCERTAMENTI POTRANNO ESSERE REALIZZATI PRESSO LA CLINICA EUGIN

- DURANTE LA SUA PRIMA VISITA -

AD UN PREZZO RIDOTTO RISPETTO AL SUO PAESE

**Non vi è alcun inconveniente se il giorno della prima visita coincide con la mestruazione\***

TUTTAVIA, SE PER QUALCHE MOTIVO DESIDERA PORTARLI GIÀ FATTI, LE INDICHIAMO LA LISTA DEGLI ESAMI E LA LORO VALIDITÀ

### MOLTO IMPORTANTE PER L'UOMO:

La preghiamo di mantenere un'astinenza sessuale di 3-4 giorni, in modo che sia possibile congelare un campione di seme il giorno della prima visita nelle migliori condizioni possibili.

In caso di azoospermia o impossibilità di ottenere un campione di seme:

è imprescindibile comunicarcelo precedentemente, in modo da permetterci di studiare il Suo caso individualmente e valutare la necessità di sottoporLa, contemporaneamente alla prima visita, ad una visita con l'andrologo o una biopsia testicolare.

## UOMO

## VALIDITÀ

### Analisi del sangue

- **Emocromo completo**, gruppo sanguigno ed Rh. (effettuare solo una volta)
- **Sierologie** (VDRL o RPR e TPHA o FTA-ABS, epatite C, HIV, antigene epatite B) (in assenza di infezione cronica, 1 anno)
- **Esami di coagulazione** (PT, aPTT) (6 mesi)
- **Cariotipo**: è auspicabile avere a disposizione i risultati di questo esame fin dalla prima visita ed è altamente raccomandabile nei seguenti casi: fattore maschile, fecondazione fallita in cicli precedenti di FIV, cicli precedenti di FIV falliti (indipendentemente dalla qualità degli embrioni). (effettuare una sola volta)
- **Studio genetico della mucoviscidiosi**: è raccomandabile ma non indispensabile disporre di quest'esame in vista di uno screening. (effettuare una sola volta)

### Altri (presentarli solo se sono già stati effettuati):

- Spermioγραμμα, biopsia testicolare o referto dell'andrologo, microdelezione del cromosoma Y ecc.
- In caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita, sarà imprescindibile presentare un referto dell'infettivologo, come indicato nel modello allegato.
- In caso di vaccinazione per l'epatite B, se possiede analisi con **HB Ac** (anticorpo) e le presenta il giorno della prima visita non dovrà ripeterle.

### Striscio uretrale (solo in caso di infezione da virus di immunodeficienza acquisita)

- Gonococco e Chlamydia. (1 anno)